

PROIECT CEEC 90/2006 PRO- PAINCONTROL

PROTOCOL DE ANALGEZIE POSTOPERATORIE PCA NEUROCHIRURGIE

| | |
|---|---|
| INTERVENTIE CHIRURGICALA: | URGENTA: da <input type="checkbox"/> nu <input type="checkbox"/> |
| Antecedente medicale relevante: | |
| Alergii medicamentoase / reactii adverse: | |
| Istoric de utilizare analgezice / AINS: | |
| Contraindicatii AINS: DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> | (contraindicatii: insuficienta cardiaca, coagulopatii, insuficienta renala, istoric ulcer, motive chirurgicale) |
| CONSIMTAMINT DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> | FISA INFORMARE PACIENT DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| PROTOCOL 1 | <input type="checkbox"/> Tramadol 100 mg administrate intraoperator | |
| | <input type="checkbox"/> Tramadol 8mg/ml (400 mg/50 ml) pev continua 2 ml/ora (16 mg/ora) - se va administra timp de 24 ore postoperator | |
| PROTOCOL 2 | <input type="checkbox"/> Fentanyl 50 mcg/ml | Doza bolus: 25 mcg Perioada refractara 15 min Infuzie bazala 12,5 mcg/ora = 0,25ml/ora |
| | <input type="checkbox"/> Metamizol 60 mg /ml (3000 mg/50 ml) pev continua 2 ml/ora (120 mg/ora) - se va administra timp de 24 ore postoperator | |
| PROTOCOL 3 | <input type="checkbox"/> Metamizol 60 mg /ml (3000 mg/50 ml) pev continua 2 ml/ora (120 mg/ora) - se va administra timp de 24 ore postoperator | |
| ADJUVANTE | <input type="checkbox"/> Acetaminofen (Perfalgan) - 1g iv la 8 ore | |
| | <input type="checkbox"/> Diclofenac + orfenadrina (Neodolpase 250 ml) -1 flacon/24 ore | |
| | <input type="checkbox"/> Ketorolac (Ketorol) -10 mg iv la 4 ore | |
| | omeprazole sau ranitidina asociat la AINS | |
| PROTOCOL ANTIEMETIC | <input type="checkbox"/> Dexametazona 8 mg iv (! Daca NU se folosesc AINS ca adjuvante si daca NU exista alte contraindicatii) | |
| | <input type="checkbox"/> Metoclopramid 10 mg (! Contraindicatii in B. Parkinson, Sd. Extrapiramidale) - daca este ineficient, se adauga dupa 30 min ondansetron | |
| | <input type="checkbox"/> Ondansetron 4 mg iv - daca este ineficient, se repeta inca 4 mg iv dupa 15 min | |
| | Daca protocolul de mai sus este ineficient, chemati medicul anestezist !!! Daca FR < 8 si Nivel Sedare > 2 se va adm. Nalorfina 0,5 mg iv si 1-2 mg sc | |

PROIECT CEEEX 90/2006 PRO- PAINCONTROL

PROTOCOL DE ANALGEZIE POSTOPERATORIE PCA CHIRURGIE GENERALA

| | |
|---|---|
| INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ: | URGENTĂ: da <input type="checkbox"/> nu <input type="checkbox"/> |
| Antecedente medicale relevante: | |
| Alergii medicamentoase / reacții adverse: | |
| Istoric de utilizare analgezice / AINS: | |
| Contraindicații AINS: DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> | (contraindicații: insuficiența cardiacă, coagulopatii, insuficiența renală, istoric ulcer, motive chirurgicale) |
| CONSIMITĂMINT DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> | FISA INFORMARE PACIENT DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> |

| ANALGEZIE CONTROLATĂ DE PACIENT IV (PCA) | | |
|--|--|---|
| Scor de durere 6-8 (moderat-severă și severă) colecistectomia clasică, chirurgia oncologică gastrică, colorectală, pancreatică, chirurgia recto-anală, chirurgia retroperitoneală | <input type="checkbox"/> Morfina 1 mg/ml (doza se reajustează la <50 kg) | Doza bolus 2mg Perioada refractară 15 min Rata de infuzie bazală 1mg/h |
| Scor de durere 4-6 (moderată) ulcer gastric/duod, colecistectomia laparoscopică, mastectomie, gastrostomie | <input type="checkbox"/> Petidina 10 mg/ml | Doza bolus 10mg Perioada refractară 15 min Rata de infuzie bazală 10mg/h |
| | <input type="checkbox"/> Tramadol 400 mg/50 ml | Rata de infuzie bazală 2 ml/oră |
| Scor de durere 3-4 (ușoară) apendicectomie, colostomie, cura hernie, cura varice membru inferior | <input type="checkbox"/> Metamizol 60 mg/ml (3000 mg/50 ml) pev continuă 2 ml/oră (120 mg/oră) - se va administra timp de 24 ore postoperator | |
| ANALGEZIE EPIDURALĂ CONTROLATĂ DE PACIENT (PCEA) | | |
| Scor de durere 6-8 (moderat severă, severă) Scor de durere 4-6 (moderată) și antecedente de disfuncție de organ | Nivel de plasare cateter - Toracic <input type="checkbox"/> Lombar <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> Ropivacaina 0.2% (2 mg/ml) | Bolus 3 ml Perioada refractară 20 min Rata de infuzie bazală 5 ml/h Doza maximă la 1 ora 15 ml |
| | In caz de analgezie ineficientă <input type="checkbox"/> Ropivacaina 0.2% (2 mg/ml) | Bolus 3 ml Perioada refractară 20 min Rata de infuzie bazală 7 ml/h Doza maximă la 1 ora 25 ml |
| | <input type="checkbox"/> Levobupivacaina 0,1-0,2 % | Bolus 3 ml Perioada refractară 20 min Rata de infuzie bazală 5 ml/h Doza maximă la 1 ora 10 ml |
| | <input type="checkbox"/> Bupivacaina 0,0625 – 0,125% | Bolus 3 ml Perioada refractară 30 min Rata de infuzie bazală 5 ml/h |
| ADJUVANTE | <input type="checkbox"/> Acetaminofen (Perfalgan) - 1g iv la 8 ore <input type="checkbox"/> Diclofenac + orfenadrina (Neodolpase 250 ml) -1 flacon/24 ore <input type="checkbox"/> Ketorolac (Ketorol) -10 mg IV la 4 ore <input type="checkbox"/> Metamizol 1 g IV la 8 ore <input type="checkbox"/> Tramadol 50 – 100 mg IV lent în 10 – 15 minute la 8 ore <input type="checkbox"/> Morfina - 4 mg SC la 6 ore | |

